

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ, КЪМ ЛИЦЕНЗ
ЗА УПОТРЕБА № 0022-1827-17.07.2012**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Болфо противопаразитна каишка за малки кучета и котки

Bolfo® collar for small dogs and cats

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

пророхуг 98,7 мг/г

Всяка каишка Bolfo collar for small dogs and cats с дължина 38 см и тегло 12,5 г, съдържа 1,23 г пророхуг.

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Противопаразитна каишка.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета и котки.

4.2 Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни

За профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета и котки.

4.3 Противопоказания

Да не се прилага при животни, продукцията от които се използва за човешка консумация.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Да не се оставят животни с поставени каишки в близост до малки деца или бебета.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се употребява при болни животни или животни в оздравителен период.

Да не се употребява при животни, които кърмят малките си.

Да не се употребява при малки кученца ненавършили тримесечна възраст.

Да не се употребява при кучета с кожни увреждания.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Да не се яде, пие или пуши по време на прилагането.

4.6 Странични реакции (честота и важност)

През първите дни от употребата, в много редки случаи може да се прояви кожна чувствителност – сърбеж или зачервяване на мястото на приложение.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не се прилага по време на лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни.

4.9 Доза и начин на приложение

Каишката е предназначена за употреба при кучета с телесна маса под 10 кг и котки.

Само за външно приложение!

Извадете противопаразитната каишка от опаковката и я развийте от навитото положение, в което се намира. Поставете каишката около врата на животното. При правилно поставяне на каишката трябва да остане разстояние от поне два пръста между каишката и врата на животното. В случаи, когато козината на животното е замърсена е препоръчително то да бъде изкъпано преди поставяне на каишката за постигане на оптимален ефект. Каишката е водоустойчива, но не се препоръчва животното да се къпе с нея. В такива случаи е добре каишката да се свали и след подсушаване на козината да се постави отново.

Оптималният ефект от действието на каишката се достига 24 часа след поставянето ѝ на врата на животното. Продължителността и ефикасността на действие на каишката зависят от дължината и състоянието на козината, от активността на животното и степента на опаразитяване. Каишката е ефективна в продължение на 4 месеца срещу бълхи и 10 седмици срещу кърлежи.

Бълхите върху животното умират няколко часа след поставяне на каишката. Кърлежите биват убивани приблизително в рамките на един ден от поставянето на каишката. Умрелите кърлежи се отделят сами от животното или с лекота могат да бъдат отстранени.

Volfo каишката е ефективна срещу бълхи и кърлежи, ако се използва непрекъснато. Загубата на активността ѝ може да бъде проверена, като се надраска повърхността на каишката с остър метален предмет. Ако мястото на надраскването е бяло на цвят, каишката е все още активна. В противен случай, каишката трябва да бъде заменена с нова.

Много рядко е възможна появата на кърлежи и по време на носенето на каишката. Това са кърлежи останали скрити в козината на животното, но те ще бъдат убити и ще паднат от космената покривка без да са смукали кръв.

Бълхите могат да бъдат гостоприемници на тении, затова е препоръчително да се използват и ендопаразитициди в същото време.

Освен бълхите нападнали кучето, заобикалящата среда също може да е заразена от яйца, ларви и какавиди на бълхи. От тях могат да се развият нови бълхи. Поради тази причина е важно да се осъществява ефективен контрол на тези ранни стадии от развитието на паразитите в непосредственото обкръжение на кучето, посредством прилагането на подходящ, разрешен инсектицид.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Поради естеството на фармацевтичната форма предозирането е невъзможно. При случайно поглъщане на части от каишката е възможно да се появят странични ефекти като повишено слюноотделяне, свиване на зениците, повръщане и разстройство. В такива случаи веднага се посъветвайте с ветеринарен лекар. Антидот: атропин сулфат.

4.11 Карентен срок

Не се изисква.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Несистемни инсектициди – карбамати.

ATCvet код: QP53AE02.

5.1 Фармакодинамични свойства

Карбаматен инсектицид с ниска токсичност при бозайниците, който бързо се метаболизира и не се натрупва в тъканите.

Инхибира холинестеразата, което е относително бързо обратимо.

5.2 Фармакокинетични особености

Основните метаболити са определени като O-hydroxyphenyl N-methylcarbamate и 2-isopropoxyphenol, крайния метаболит, който се отделя с урината е glucuronide. Урината е вероятният основен път за екскреция на това съединение.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

N-бутил-адипат, диетилхексил-фталат, соево масло, стеаринова киселина, оцветител (смес на железен оксид и титаниев оксид), pvc.

6.2 Несъвместимости

Да не се прилага едновременно с други инсектициди.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 5 години.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Картонена кутия с 1 каишка във фолиева опаковка.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Bayer Animal Health GmbH D-51368 Leverkusen Germany

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

№ 0022-1827-17.07.2012

9. ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
17.07.2012

10. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
Март 2012 г.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА
Няма.
Без лекарско предписание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР